

## SKŁADANIE KARMNIKA DLA PTAKÓW

Zanim wystawisz karmnik na zewnątrz, możesz go pomalować według własnego uznania, a następnie polakierować w celu ochrony przed wilgocią.

W zimie, kiedy temperatury na zewnątrz są bardzo niskie, trudniej jest ptakom samodzielnie znajdować pożywienie. Dlaczego w zimie potrzebują naszej pomocy? W normalnych warunkach ptaki żywią się jagodami, ziarnami, owadami, itp. Kiedy jest bardzo zimno, na krzewach nie ma już jagód, nie ma także ziarna na polach ani robaków w zmrożonej ziemi. Wiele gatunków ptaków opuszcza zimą swój kraj pochodzenia, ponieważ jest za zimno.

Takie ptaki nazywa się „ptakami migrującymi”. Na przykład bociany każdego roku zimują w Afryce. Ale inne ptaki pozostają przez cały rok w tym samym miejscu, np. dzięcioł duży, sikorka, kos, drozdy, wszystkie gatunki zięby, sroka, rudzik, wróbel. Nazywa się je „ptakami osiadłymi”. W zimie ptaki starają się zbyt dużo nie ruszać, ponieważ ruszając się, zużywają dużo energii, której nie mogą czerpać z pożywienia. Potrzebują tłuszczu znajdującego się w ziarnach słonecznika bądź prosa.

## ZASIEJ WŁASNE ZIARNA

**Słonecznik:** Zasiać na zewnątrz w kwietniu, w pojemniku, po jednym ziarnie, a następnie posadzić w maju. Zasadzić lub zasiać w odstępach 40 cm w rzędach oddalonych o 50 cm. Wystarczy regularnie podlewać. Czas kiełkowania: 10 - 15 dni – Początek kwitnienia: lipiec – Kwitnienie: lipiec – wrzesień

**Proso:** Zasiać rzutowo na zewnątrz w czerwcu-lipcu. Wystarczy regularnie podlewać. Aby móc zebrać proso zwyczajne należy poczekać, aż ziarna będą suche i z łatwością będzie można je wyłuskać z kłosa, ściskając je palcami. Czas kiełkowania: 10 - 15 dni – Początek kwitnienia: lipiec – Zbiór: koniec lata

## ROZPOZNAWANIE PTAKÓW

**Sikora modra:** Jest to niewielki ptaszek, którego często można spotkać w ogrodzie. Łatwo go rozpoznać po żółtym brzuszku i niebieskim grzbiecie. Sikora przepada za ziarnami słonecznika i jest zdolna do wykonywania niezwykłych akrobacji, byle tylko dostać się do pożywienia.

**Zięba zwyczajna:** Ten ptak przemieszcza się często w dużych grupach. Samce mają brązowopomarańczowe upierzenie i szaroniebieskie głowy. Samiczki są mniej kolorowe – mają szarozielony grzbiet i szarobiały brzusek.

**Rudzik:** Łatwo go rozpoznać po pomarańczowej szyjce, jasnobrązowym grzbiecie oraz zaokrąglonym kształcie. Zazwyczaj przemieszcza się w pojedynkę i jest często widywany w pobliżu domów. Nie je owoców ani ziaren, ale uwielbia okruszki, tłuszcze oraz resztki spożywcze. Po uprzątnięciu ze stołu śmiało możecie wysypać okruszki na zewnątrz!

**Wróbel domowy:** W jego upierzeniu dominuje kolor brązowy i szary. Ptak ten często przemieszcza się w grupach. Samiczka jest zazwyczaj bladobeżowa, natomiast samiec jest bardziej kolorowy – jego upierzenie cechują czarne i brunatne plamy.